

শিশুদের নিয়মিত টিকাদান সময়সূচি

| রোগের নাম | টিকার নাম | টিকার ডোজ | ডোজের সংখ্যা | ডোজের মধ্যে ন্যূনতম বিরতি | টিকা দেয়ার সঠিক সময় | টিকাদানের স্থান | টিকার প্রয়োগ পথ |
|---|---|------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| যক্ষ্মা | বিসিজি | ০.০৫ এম এল | ১ | - | জন্মের পর থেকে | বাম বাহুর উপরের অংশে | চামড়ার মধ্যে |
| ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্ঠংকার, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি | পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা (ডিপিটি, হেপাটাইটিস-বি, হিব) | ০.৫ এম এল | ৩ | ৪ সপ্তাহ | ৬ সপ্তাহ ১০ সপ্তাহ ১৪ সপ্তাহ | বাম উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে | মাংসপেশী |
| নিউমোকোকাল নিউমোনিয়া | পিসিডি টিকা | ০.৫ এম এল | ৩ | ৪ সপ্তাহ | ৬ সপ্তাহ ১০ সপ্তাহ ১৪ সপ্তাহ | ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে | মাংসপেশী |
| পোলিওমাইলাইটিস | বিওপিডি | ২ ফোঁটা | ৩ | ৪ সপ্তাহ | ৬ সপ্তাহ ১০ সপ্তাহ ১৪ সপ্তাহ | মুখে | মুখে |
| | আইপিডি (ফ্রাকশনাল) | ০.১ এম এল | ২ | ৮ সপ্তাহ | ৬ সপ্তাহ ১৪ সপ্তাহ | ডান বাহুর উপরের অংশে | চামড়ার মধ্যে |
| হাম ও রুবেলা | এমআর টিকা | ০.৫ এম এল | ২ | - | ৯ মাস ও ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে | ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে | চামড়ার নীচে |

১৫-৪৯ বছর বয়সের মহিলাদের টিকাদান সময়সূচি

| রোগের নাম | টিকার নাম | টিকার ডোজ | ডোজের সংখ্যা | টিকা শুরু করার সঠিক সময় | টিকাদানের স্থান | টিকার প্রয়োগ পথ |
|------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| ধনুষ্ঠংকার | টিটি (টিটেনাস টক্সয়েড) | ০.৫ এম এল | টিটি-১ | ১৫ বছর বয়স হলেই যথাশীঘ্র | বাহুর উপরের অংশে | মাংসপেশী |
| | | | টিটি-২ | টিটি-১ পাওয়ার কমপক্ষে ২৮ দিন পর | | |
| | | | টিটি-৩ | টিটি-২ পাওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর | | |
| | | | টিটি-৪ | টিটি-৩ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বৎসর পর | | |
| | | | টিটি-৫ | টিটি-৪ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বৎসর পর | | |

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার